

Alíviate con Pepsamar®



Pepsamar®, solución completa que te libra de varios de los síntomas del **malestar gástrico**

Acidez estomacal

Pepsamar® gel



Listas para consumir

Acciones

- Alivio rápido de la acidez.^{2,3}

Presentaciones¹

Suspensión: 150 mL/360mL

Tabletas: 100 und.

Ingredientes: Hidróxido de Aluminio



Dosificación¹

- 1 a 2 cucharadas (10 a 20 mL) 4 veces al día. Una hora después de cada comida y antes de acostarse.



Acidez y reflujo

Pepsamar® reflux



Doble acción

Acciones

Su fórmula crea un gel flotante funciona como una barrera impidiendo que la comida y los ácidos estomacales regresen al esófago.⁴



Presentaciones¹

Suspensión: 180 mL

Ingredientes: Hidróxido de Aluminio, Carbonato de Magnesio, Carbonato de Calcio y Alginato de Magnesio.



Dosificación¹

- 1 a 2 cucharadas (10 a 20 mL) 4 veces al día. Una hora después de cada comida y antes de acostarse.



Acidez, hinchazón y gases

Pepsamar® plus



Doble acción


Acciones

- Alivia la acidez y distensión abdominal.^{2,5}
- Disminuye los gases.⁵

Presentaciones¹

Suspensión: 150 mL/360mL

Ingredientes: Hidróxido de Aluminio, Hidróxido de Magnesio y Simeticona.



Dosificación¹

- 1 a 2 cucharadas (10 a 20 mL) 4 veces al día. Una hora después de cada comida y antes de acostarse.



Referencias:

1. Información prescriptiva Pepsamar®.
2. Alex Mejia y Walter K. Kraft. Pharmacology and Therapeutics: Principles to Practice, CHAPTER 31, 457-473
3. G. Gasbarrini, P. Andreone, M. Baraldini, C. Cursaro & E. Micalletti (1990) Antacids in Gastric Ulcer Treatment: Evidence of Cytoprotection, Scandinavian Journal of Gastroenterology, 25:sup174, 44-47
4. MANDEL. Review article: alginate-raft formulations in the treatment of heartburn and acid reflux. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14: 669-690.
5. Serra. Gas intestinal y enfermedad funcional del tracto digestivo. Gastroenterol Hepatol 2003;26(4):263-9