


Dispositivo de seguridad Safety Lock®

Jeringa con **protector de aguja para todas las presentaciones**, ofrece protección contra accidentes biológicos percutáneos.¹

5.



5. Inyectar lentamente hasta que se **active el sistema de seguridad presionando el émbolo hasta el final**.



6.

6. **No frotar ni presionar la piel tras la inyección. No frotar la zona después de la aplicación.**

7.



7. Desecha la jeringa **inmediatamente**.



Material diseñado con fines educativos. La información presentada en este material es elaborada por Mad Critter S.A.S y contiene recomendaciones generales que en ningún caso pretenden reemplazar la consulta médica. Estas recomendaciones deben ser discutidas y acordadas con su médico tratante.

MAT-CO-2100168 01/21



ENOXAPARINA

Instrucciones de aplicación del medicamento

SANOFI



¿Tu médico te formuló **Enoxaparina**?


En este folleto te indicaremos de forma sencilla cómo administrarlo correctamente.



La Enoxaparina es un medicamento de uso inyectable por vía subcutánea y **debe administrarse siempre a la misma hora, siguiendo las recomendaciones de tu médico tratante.**

¿Dónde se debe **aplicar**?


El lugar más adecuado para la aplicación es la zona abdominal, en el lado derecho e izquierdo alternadamente, **a 5 cm desde la cintura hacia el ombligo.**



Importante:

No administrar en una **zona enrojecida, con marcas o cicatrices.**


Existen zonas alternativas que **solo deben considerarse** en caso de que resulte imposible la aplicación en la zona abdominal:



Forma de **aplicación**




1. Comprueba la **validez de la inyección, así como la transparencia de la solución** y finalmente si la dosis corresponde con la prescripción, ya que la Enoxaparina **tiene distintas presentaciones.**



2. Desinfecta la zona dónde será aplicada la inyección con **un algodón impregnado en alcohol, sin frotar.** Para facilitar el acceso a la zona del abdomen el paciente debe estar acostado durante la administración.



3. Quita el capuchón de la jeringa, **sin eliminar el aire antes de la inyección** ya que aumenta el riesgo de hematomas.



4. Forma un pliegue con la piel entre **el pulgar y el índice.** Inserta la aguja en el pliegue de la piel en un **ángulo de 90° y presiona el émbolo** hasta que se inyecte todo el medicamento. **No sueltes el pliegue de la piel** mientras está inyectando.