



# Enoxaparina sin dispositivo de seguridad **Safety Lock®**



5. Inyectar lentamente **presionando el émbolo hasta el final.**



6. **No frotar ni presionar la piel tras la inyección.  
No frotar la zona después de la aplicación.**



7. Desecha la jeringa **inmediatamente en un recipiente adecuado (Guardián).**



Material diseñado con fines educativos. La información presentada en este material es elaborada por Mad Critter S.A.S y contiene recomendaciones generales que en ningún caso pretenden reemplazar la consulta médica. Estas recomendaciones deben ser discutidas y acordadas con su médico tratante.

MAT-CO-2100083 01/21



Si te entregaron  
**Enoxaparina**  
sin dispositivo de seguridad sigue  
estas instrucciones **de aplicación.**

 SANOFI

## ¿Tu médico te formuló Enoxaparina y te la entregaron sin dispositivo de seguridad?


En este folleto te indicaremos de forma sencilla cómo administrarla correctamente.



**La Enoxaparina** es un medicamento de uso inyectable por vía subcutánea y debe administrarse siempre a la misma hora, siguiendo las recomendaciones de tu médico tratante.

## ¿Dónde se debe aplicar?


El lugar más adecuado para la aplicación es la zona abdominal, en el lado derecho e izquierdo alternadamente, a 5 cm desde la cintura hacia el ombligo.



### Importante:

No administrar en una **zona enrojecida, con marcas o cicatrices.**


Existen zonas alternativas que **solo deben considerarse** en caso de que resulte imposible la aplicación en la zona abdominal:



## Forma de aplicación




1. Comprueba la **validez de la inyección, así como la transparencia de la solución** y finalmente si la dosis corresponde con la prescripción, ya que la Enoxaparina **tiene distintas presentaciones.**



2. Desinfecta la zona donde será aplicada la inyección con **un algodón impregnado en alcohol, sin frotar.** Para facilitar el acceso a la zona del abdomen el paciente debe estar acostado durante la administración.



3. Quita el capuchón de la jeringa, **sin eliminar el aire antes de la inyección** ya que aumenta el riesgo de hematomas.



4. Forma un pliegue con la piel entre **el pulgar y el índice.** Inserta la aguja en el pliegue de la piel en un **ángulo de 90° y presiona el émbolo** hasta que se inyecte todo el medicamento. **No sueltes el pliegue de la piel** mientras está inyectando.